



Des récoltes précoces pour des fourrages de qualité

Avis d'experts de la Chambre d'Agriculture de la Creuse

Des fourrages bien valorisés par les animaux

« Dans le cadre du suivi de la croissance des 18 génisses d'élevage du Gaec de Replat (à Dontreix en Creuse), la qualité des fourrages récoltés a permis de revoir à la baisse la quantité de concentrés dans la ration. Les fourrages utilisés sont de l'enrubannage de 2^{ème} coupe récolté à 42 jours de repousse et du foin très riche en fibres récolté à 1 400°C le 21 juin 2014. Il est primordial d'utiliser du fourrage de qualité sur cette catégorie d'animaux dont la capacité d'ingestion est réduite. Le lot des génisses a dépassé l'objectif de croissance journalière hivernale de 700g. L'herbe récoltée jeune est la clé de réussite pour des croissances correctes sans provoquer un état d'engraissement excessif »

Laurent ROMAIN, conseiller territorial GDA Auzances et Marc DUDRUT conseiller service élevage

Marc DUDRUT (à gauche), conseiller service élevage

Laurent ROMAIN (à droite) conseiller territorial GDA Auzances



Un éclairage nouveau grâce aux analyses de fourrages

« C'est après avoir participé aux mesures d'évolution des valeurs alimentaires de l'herbe sur pied que nous avons pris conscience qu'il fallait absolument faucher les ray-grass dès que le cumul de 800°C était atteint. Cette action avait été initiée en 2014 par notre « groupe herbe » d'Auzances, et au cours de la formation axée sur la qualité des fourrages, on a bien vu que vers 700°C l'herbe valait plus d'une UF par kilo de matière sèche et qu'en à peine 10 jours, elle avait déjà perdu 0.2UF !

Cette année, dès que le temps permettra de faucher, on lancera les chantiers d'enrubannage, quitte à déléguer le pressage et l'enfilage à l'entreprise si la période tombe en même temps que les semis de maïs.

En fauchant plus tôt que d'habitude, c'est à dire à partir de 800°C, on va récolter du bon fourrage et en plus ça nous donnera de la souplesse pour exploiter le deuxième cycle des repousses en pâturage ou en 2^{ème} coupe. »

« Cet hiver, le suivi de croissance des laitones nous a montré qu'il était important de connaître la valeur des fourrages et de peser les génisses pour évaluer les prises de poids. En travaillant de cette façon, on a pu atteindre les croissances voulues et surtout adapter la complémentation sans gaspiller le grain et le complémentaire »

Patrice et Laurent DANCHAUD, Gaec de Replat Dontreix 23



Hervé Feugère

Animateur départemental du Programme Herbe et Fourrages, Chambre d'Agriculture de la Creuse
Mars 2015

Contacts pour plus d'information :

- Chambre d'Agriculture de la Corrèze : **Stéphane MARTIGNAC**, 05 55 21 55 58, stephane.martignac@correze.chambagri.fr
- Chambre d'Agriculture de la Creuse: **Hervé FEUGERE**, 05 55 61 50 00, herve.feugere@creuse.chambagri.fr
- Chambre d'Agriculture de la Haute-Vienne : **Claire BRAJOT**, 05 87 50 40 57, claire.brajot@haute-vienne.chambagri.fr
- Coop de France Limousin : **Jean-Luc PRZEWOZNY**, 05 55 79 65 73, aro.lim@orange.fr

Article rédigé par les Chambres d'Agriculture du Limousin et Coop de France Limousin, dans le cadre du Programme Structurel Herbe et Fourrages, avec le soutien financier de l'Europe et du Conseil Régional du Limousin.



Parce que l'herbe pâturée restera le fourrage le plus économique